

| Vacuna | Enfermedad renal en etapa terminal, o en diálisis | Enfermedad cardíaca o pulmonar | Enfermedad hepática crónica o alcoholismo | Diabetes |
|---|---|--------------------------------|---|--|
| Fiebre amarilla | 1 dosis única si hay riesgo, o situación epidemiológica/viaje | | | |
| Hepatitis A | Si hay factores de riesgo adicionales: 1 - 2 dosis | | 2 dosis | Si hay factores de riesgo adicionales: 1 - 2 dosis |
| Hepatitis B | 3 dosis ^a | | | |
| Influenza inactivada o recombinante | 1 dosis anual, cubierto por el sistema de salud según lineamientos nacionales de vacunación contra Influenza | | | |
| Meningococo A, C, W, Y | Si hay factores de riesgo adicionales: 2 dosis | | | |
| Meningococo B | Si hay factores de riesgo adicionales: 2 dosis | | | |
| Neumococo ^b (PCV13) | 1 dosis ^a | | | |
| Neumococo (PPSV23) | Se sugiere para Colombia 1 dosis de PCV13 seguida de PPSV23, con refuerzo de PPSV23 cinco años después | | | |
| Sarampión, paperas, rubéola SRP | 1 dosis en la edad adulta según vacunación previa y riesgo | | | |
| SARS-CoV-2 | Esquema primario + refuerzo con vacunas actualizadas ARNm | | | |
| Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap o Td) | Según riesgo y vacunas previas: 1 dosis de Tdap cada embarazo; 1 dosis de Td/Tdap para el tratamiento de heridas; 1 dosis de Tdap para "Estrategia Capullo" | | | |
| Varicela | 2 dosis si no hay evidencia de inmunidad o esquema incompleto | | | |
| Virus del papiloma humano | Si hay factores de riesgo adicionales | | | |
| Dengue ^c | | | | |
| Viruela del mono | Según riesgo : 2 dosis separadas 28 días | | | |
| Virus respiratorio sincitial | Decisión clínica compartida en embarazo y mayores de 60 años con factores de riesgo adicionales | | | |
| Zóster recombinante | 2 dosis si hay riesgo adicional o después de los 50 años | | | |

Vacuna recomendada para adultos que no tengan evidencia de inmunidad para esta enfermedad

Vacunación recomendada para adultos que no tengan evidencia de inmunidad y tengan un factor de riesgo adicional u otra indicación.

Vacunación recomendada cuando esté disponible en el país para adultos con un factor de riesgo adicional u otra indicación, excepto dengue que se recomienda independiente de los factores de riesgo individuales.

a. En población de diálisis considerar refuerzo anual, según títulos de AntiHbsAg

b. PCV15 y PCV20 cuando se encuentren disponibles.

c. La vacuna es recomendada entre los 4 y 60 años, en un esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses.