

7.3

Vacunación para mayores de 18 años con riesgos específicos

Ver tablas adicionales para consideraciones específicas de vacunación, según el riesgo individual.



Vacuna	Hombres que tienen sexo con hombres	No participa en una pareja estable y exclusivamente monógama	Persona que se inyecta drogas	Habitantes de calle	Viajero internacional	Fumador
Fiebre amarilla						
Hepatitis A					Según destino y tipo de viaje	
Hepatitis B						
Influenza inactivada o recombinante						
Meningococo A, C, W, Y						
Meningococo B						
Neumococo (PCV13, PCV15, PCV20, PPSV23)					Se recomienda si hay estancia prolongada	
Sarampión, paperas, rubéola SRP					Según destino y tipo de viaje	
SARS-CoV-2						
Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap o Td)					Según destino y tipo de viaje	
Varicela						
Virus del papiloma humano						
Dengue ^a					Según destino y tipo de viaje	
Viruela del mono						
Virus respiratorio sincitial						
Zóster recombinante						

Vacuna recomendada para esta población de adultos	Vacuna recomendada para esta población de adultos pero que tengan condiciones adicionales de riesgo (ver anexo técnico).	Vacunación recomendada <u>cuando esté disponible en el país</u> , para esta población de adultos	Vacuna recomendada para esta población de adultos <u>cuando esté disponible en el país</u> , pero que tengan condiciones adicionales de riesgo (ver anexo técnico)	Evitar en esta población	Sin recomendación específica para esta población
---	--	--	--	--------------------------	--

a. La vacuna es recomendada entre los 4 y 60 años, en un esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses.